IVERCANIS®

IVERMECTINA | ANTIPARASITÁRIO
Uso Veterinário

World® VETERINÁRIA

Fórmula:

Cada comprimido de 3mg contém:
Ivermectina 3mg
Excipiente q.s.p. 180mg

Cada comprimido de 6mg contém:
Ivermectina 6mg
Excipiente q.s.p. 360mg

Cada comprimido de 12mg contém:
Ivermectina 12mg
Excipiente q.s.p. 720mg

IverCanis é um potente sarnicida, cujo princípio ativo é a ivermectina, endectocida do grupo das lactonas macrocíclicas. A ação da ivermectina contra os parasitas se relaciona à inibição da motilidade do parasito. Sabe – se hoje que essa molécula se liga seletivamente com alta afinidade aos canais de íon cloreto ligados ao glutamato nos nervos e nas células musculares dos invertebrados. Esses canais podem ocorrer bem próximos aos locais ligados ao GABA (ácido γ-aminobutírico). A ivermectina, assim como outras lactonas macrocíclicas, pode potencializar a atividade do GABA nos pontos de ligação em doses maiores. Nos artópodes, o local primário de ação é a junção mioneural, sendo o influxo de íon cloreto fator de diminuição da resistência da membrana celular com consequência a hiperpolarização do potencial de repouso das células pós-sinápticas. O resultado é uma paralisia flácida do parasito, que perde fixação e morre. Existem também mecanismos de interferência na reprodução dos parasitos, mas isto ainda não está bem esclarecido.

Indicações: IverCanis tem como componente ativo a ivermectina, um agente ectoparasiticida indicado para o tratamento de Sarna Sarcóptica causada por *Sarcoptes scabiei* (*var. canis*).

Posologia: Administrar, por via oral, 0,2mg/kg/dia, de acordo com o peso corporal, em dose única. Sendo:

1 comprimido de **IverCanis 3mg** para ..... 15 kg
1 comprimido de **IverCanis 6mg** para ..... 30 kg
1 comprimido de **IverCanis 12mg** para ..... 60 kg

Os comprimidos poderão ser partidos em seu(s) sulco(s) para ajuste de dosagem. Em caso de infestações severas, em estágio de evolução adiantado, para controlar ninfas resultantes da eclosão dos ovos não atingidos pelo tratamento inicial, a dose poderá ser repetida uma ou duas vezes, com intervalos de 7 dias, a critério do Médico Veterinário.

Apresentações:

IverCanis 3mg; IverCanis 6mg e IverCanis 12mg

- Cartucho com 4 comprimidos
- Display com 12 cartuchos contendo 4 comprimidos cada

Efeitos adversos: Eventualmente podem ser observadas ataxia, incoordenação, tremores, convulsões, hipersalivação, sonolência, depressão/letargia, alterações comportamentais, midríase, vômitos, diarreia e anorexia. Estes efeitos desaparecem após a suspensão temporária da droga ou redução da dosagem.

Contraindicações: Não administrar o produto em cães da raça Collie, Pastor de Shetland, Border Collie, Old English Sheepdog, Australian Sheepherd (Pastor Australiano) e nos cruzamentos destas raças. Recomenda-se o acompanhamento rigoroso das raças Galgo Afegão, Saluki, Whippet, Greyhound e Samoyed submetidos à terapia. Há evidências de que esses animais apresentam maior sensibilidade à ivermectina, componente ativo do **IverCanis. IverCanis** não é recomendado para filhotes de qualquer raça com menos de 6 semanas de vida e em cadelas em período de gestação ou lactação.

Precauções: O uso deste medicamento deve ser evitado durante a gestação, uma vez que a segurança nesses casos ainda não foi estabelecida. A ivermectina é eliminada no leite em pequenas concentrações, portanto, **IverCanis** não deve ser administrado durante o período de lactação. Não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em filhotes com menos de seis (6) meses. Recomenda-se cautela quanto à administração de **IverCanis** associado com outros agentes que deprimem a atividade do sistema nervoso central. Conservar em local fresco (15°C a 30°C) e seco, na embalagem original fechada, ao abrigo da luz solar - Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Intoxicação e superdosagem nos animais: Em casos de intoxicação acidental podem ser observados: apatia, miotonia, dificuldade respiratória, bradicardia, redução da pressão arterial, tremores e, em casos graves, espasmos musculares. O tratamento deverá ser sintomático, uma vez que não existe antídoto específico, adotando-se medidas que visam a eliminação ou aceleração da excreção do produto, como lavagem gástrica ou uso de laxativos salinos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 9.661/2012, em 23/01/2012.

Responsável Técnica: Dra. Carla Fabiana da Silva - CRF/SP 79.096.

Proprietário/Fabricante A: World Veterinária Comércio e Indústria Ltda.
Rua Gastão Vidigal, 1130 - Distrito Industrial - Bady Bassitt-SP - CEP: 15115-000.
CNPJ: 06.187.221/0001-05 - Indústria Brasileira.

Fabricante B: Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 50.472.547/0001-68 - Indústria Brasileira.

World VETERINÁRIA
SAMP
(Serviço de Atendimento Mundo Pet)
17 3258-2020
worldveterinaria.com.br